


大腸ポリープを切除された様用経過表

- ◆大変お疲れさまでした。
- ◆大腸ポリープ切除は、手術と同じです。ポリープの切除部位からの出血を防ぐために、下記内容をお守りください。

治療当日		治療翌日以降			
/ ()		/ () ~次回来院日前日まで		/ ()	
薬	夕(帰宅後) ・止血剤 「S-アドカル錠 1錠」 「オファルムK 2錠」を 水で飲んで下さい。 	朝・夕と ・普段から飲んでいる薬のうち あらかじめ当院から 指示された薬だけを 飲むようにして下さい。 「S-アドカル錠 1錠」 「オファルムK 2錠」を水で飲んで下さい。 		朝 「S-アドカル錠 1錠」 「オファルムK 2錠」を 水で飲んで下さい。 ※このお薬はこれで終わりです。 	
食事と日常生活	・夕食は、食べないで下さい。  ・少量の水またはお茶など 刺激の少ない水分摂取は、 かまいません。  ・入浴(シャワー)は、しないで下さい。  	← ・消化の良い柔らかい食べものをとって下さい。 ・次回来院日までは食事の制限を守ってください。 ○ <u>とって良いもの</u> 「柔らかいお粥、うどん、豆腐 卵、脂肪の少ない肉、白身魚 じゃがいも、バナナ、りんご等」  × <u>とってはいけないもの</u> ・脂っこいもの、生もの ・繊維質の多いもの 「生野菜、海藻類、きのこ類、豆類 柿、梨、パイナップル等」  ・刺激の強いもの 「辛い物、コーヒー、炭酸飲料等」 ・アルコール類  ・入浴してかまいません。 シャワーや短時間の入浴から徐々に通常に 戻していくようにして下さい。 		→ ・ポリープ切除の後、指定の日に診察を 受けていただきます。 来 院 日 ・徐々に通常の食事に戻していくようにして下さい。 ・医師の指示に従って、徐々に通常の生活に 戻していくようにして下さい。	
確認事項	●万一以下の症状があった場合は、まず電話にてご連絡くださるか、ご来院ください。なお、切除後の最初の便には少量の血が混じることがあります。 ・腹痛が続くとき ・便に血が混じるとき(量が多い場合、切除後2回目以降の排便時に出血がある場合。) ●当治療の結果説明と、診察がありますので _____月_____日() _____頃、ご来院下さい。 ●生命保険給付について。				